

| 種類 | ワクチン | | 対象者 | 標準的な接種方法 | 標準的な接種期間 |
|-----|---|---------------------------|---|---|--|
| 経口生 | ロタウイルス | ロタリックス 1価：2回 | 出生6週0日後から24週0日後までの間にある方 ※1回目は出生14週6日後までに接種 | 出生6週0日後から27日以上の間隔をおいて 24週0日までに2回 | 初回接種を生後2か月から出生14週6日後までに開始 |
| | | ロタテック 5価：3回 | 出生6週0日後から32週0日後までの間にある方 ※1回目は出生14週6日後までに接種 | 出生6週0日後から27日以上の間隔をおいて 32週0日までに3回 | |
| 不活化 | ヒブ 初回：3回 追加：1回 | | 生後2か月から5歳の誕生日の前日までの方 ※令和6年度から五種混合ワクチンに含まれるようになりました。 | 初回は27日以上の間隔で3回、初回接種終了後7か月以上（標準的には7～13か月）の間隔をおいて追加1回 | 初回接種は生後2か月～7か月末満 (初回接種開始時期で回数が異なる) |
| | 小児肺炎球菌 初回：3回 追加：1回 | | 生後2か月から5歳の誕生日の前日までの方 | 標準的には生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月に至った日以降において1回 | 初回接種は生後2か月～7か月末満 (初回接種開始時期で回数が異なる) |
| | B型肝炎 初回：2回 追加：1回 | | 生後0か月から1歳の誕生日の前日までの方 ※B型肝炎母子感染防止事業の対象者は、助成の対象とはなりません。 | 1回目から27日以上の間隔で2回目、1回目から139日以上の間隔で3回目 | 生後2か月～生後9か月末満 |
| | 四種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ） 1期初回：3回 追加：1回 | | 生後2か月から生後90か月に至るまでの方 ※令和6年度から五種混合ワクチンに含まれるようになりました。 | 初回は20日～56日の間隔で3回、初回接種終了後1年～1年6か月おいて追加1回 | 初回開始は生後2か月～1歳未満 |
| | 五種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ） | | 生後2か月から生後90か月に至るまでの方 ※令和6年2月以降に出生した児は、原則として五種混合ワクチンを接種します。 | 初回は20日～56日の間隔で3回、初回接種終了後6か月～1年6か月おいて追加1回 | 初回開始は生後2か月～7か月末満 |
| 生 | BCG：1回 | | 生後0か月から1歳の誕生日の前日までの方 | 1回 | 生後5か月～8か月末満 |
| | 麻しん・風しん混合（MR） 1期：1回 2期：1回 | | 1期：1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日までの方 2期：6歳となる日の属する年度にある方（年長児） | 1期：1回 2期：1回 | 生後12か月～生後24か月末満 小学校就学前の1年（年長児） |
| | 水痘：2回 | | 1歳の誕生日から3歳の誕生日の前日までの方 ※水痘にかかったことが無い方に限ります。 | 1歳以上3歳未満の間に2回 1回目は1歳以上1歳3か月、2回目は1回目終了後6か月から12か月おいて | 1歳以上3歳未満 |
| | 日本脳炎 1期初回：2回 1期追加：1回 2期：1回 | | 1期初回：生後6か月から生後90か月に至るまでの方 1期追加：生後6か月から生後90か月に至るまでの方 2期：9歳の誕生日から13歳の誕生日の前日までの方 | 1期初回：2回 6日以上～28日の間隔で2回 1期追加：初回終了後、おおむね1年後に1回 2期：1回 | 3歳～ おおむね4歳 9歳に達した時から10歳に達するまでの期間 |
| 不活化 | 二種混合（ジフテリア・破傷風） 2期：1回 | | 11歳の誕生日から13歳の誕生日の前日までの方 | 1回 | 11歳に達した時から12歳に達するまでの期間 |
| | HPV (ヒトパピローマウイルス) | サーバリックス 2価：3回 | 小学校6年生から高校1年生相当の女子 | 2価：1か月の間隔をおいて2回接種後、1回目から6か月以上(2回目からは2か月半以上)の間隔をおいて1回 | 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの期間（中学校1年生） |
| | | ガーダシル 4価：3回 | | 4価：2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目から6か月以上(2回目からは3か月以上)の間隔をおいて1回 | |
| | | シルガード9 9価：3回 ※または2回 | | 9価：2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目から6か月以上(2回目からは3か月以上)の間隔をおいて1回 ※1回目の接種を15歳未満で接種する場合は、6か月の間隔をおいて2回 | |