

種類	ワクチン		対象者	標準的な接種方法	標準的な接種期間
経口生	ロタウイルス	ロタリックス 1価：2回	出生6週0日後から24週0日後までの間にある方 ※1回目は出生14週6日後までに接種	出生6週0日後から27日以上の間隔を おいて24週0日までに2回	初回接種を生後2か月から出生14週6日後までに開始
		ロタテック 5価：3回	出生6週0日後から32週0日後までの間にある方 ※1回目は出生14週6日後までに接種	出生6週0日後から27日以上の間隔を おいて32週0日までに3回	
不活化	ヒブ 初回：3回 追加：1回		生後2か月から5歳の誕生日の前日までの方 ※令和6年度から五種混合ワクチンに含まれるようになりました。	初回は27日以上の間隔で3回、初回接種終了後7か月以上（標準的には7～13か月）の間隔を おいて追加1回	初回接種は生後2か月～7か月未満 （初回接種開始時期で回数異なる）
	小児肺炎球菌 初回：3回 追加：1回		生後2か月から5歳の誕生日の前日までの方	標準的には生後12月までに27日以上の間隔を おいて3回、初回接種終了後60日以上の間隔を おいて、生後12月に至った日以降に おいて1回	初回接種は生後2か月～7か月未満 （初回接種開始時期で回数異なる）
	B型肝炎 初回：2回 追加：1回		生後0か月から1歳の誕生日の前日までの方 ※B型肝炎母子感染防止事業の対象者は、助成の対象とはなりません。	1回目から27日以上の間隔で2回目、1回目 から139日以上の間隔で3回目	生後2か月～生後9か月未満
	五種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ）		生後2か月から生後90か月に至るまでの方 ※令和6年2月以降に出生した児は、原則として五種混合ワクチンを接種します。	初回は20日～56日の間隔で3回、初回接種終了後6か月～1年6か月おいて追加1回	初回開始は生後2か月～7か月未満
生	BCG：1回		生後0か月から1歳の誕生日の前日までの方	1回	生後5か月～8か月未満
	麻しん・風しん混合（MR） 1期：1回 2期：1回		1期：1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日までの方 2期：6歳となる日の属する年度にある方（年長児）	1期：1回 2期：1回	生後12か月～生後24か月未満 小学校就学前の1年（年長児）
	水痘：2回		1歳の誕生日から3歳の誕生日の前日までの方 ※水痘にかかったことが無い方に限ります。	1歳以上3歳未満の間に2回 1回目は1歳以上1歳3か月、2回目は1回目終了後6か月から12か月おいて	1歳以上3歳未満
不活化	日本脳炎 1期初回：2回 1期追加：1回 2期：1回		1期初回：生後6か月から生後90か月に至るまでの方	1期初回：2回 6日以上～28日の間隔で2回	3歳～
			1期追加：生後6か月から生後90か月に至るまでの方	1期追加：初回終了後、おおむね1年後に1回	おおむね4歳
			2期：9歳の誕生日から13歳の誕生日の前日までの方	2期：1回	9歳に達した時から10歳に達するまでの期間
	二種混合（ジフテリア・破傷風） 2期：1回		11歳の誕生日から13歳の誕生日の前日までの方	1回	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間
	HPV（ヒトパピローマウイルス）	シルガード9（9価）：3回 ※または2回	小学校6年生から高校1年生相当の女子	2か月の間隔を おいて2回接種後、1回目から6か月以上（2回目からは3か月以上）の間隔を おいて1回 ※1回目の接種を15歳未満で接種する場合は、6か月の間隔を おいて2回	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの期間（中学校1年生）