

指定医療機関

予約制 (2019年4月現在)



- ◎指定医療機関に電話で予約し、日時を確認して時間厳守でお出かけください。
- ◎体調不良の時は、予約取り消しの連絡を必ずしてください。
- ◎接種の際は、母子健康手帳、予防接種予診票、健康保険証、子ども医療費受給者証をご持参ください。

◎子宮頸がん予防ワクチンは、積極的におすすめすることを一時的に差し控えています。

医療機関名	所在地	電話番号 (市外局番0568)	ヒブ	小児肺炎 球菌	B型肝炎	四種混合	BCG	麻しん・風しん (MR)	水痘	日本脳炎	二種混合	子宮頸がん		ロタ		子ども インフルエンザ	同時接種
												サーバリックス	ガーダシル	ロタリックス	ロタテック		
かんやまクリニック	鹿田栄 109-1	23-2007	○	○	○	○		○	○	○	○					○	※
なるみやクリニック	鹿田栄 171-1	25-1981	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
あだちこどもクリニック	鹿田清水 40-1	27-3377	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
師勝整形外科	鹿田清水 54	23-4181				○				○	○					○	
徳重クリニック	鹿田神明附 26	24-3456	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○
かねここどもクリニック	鹿田西赤土 86	25-0081	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	※
済衆館病院	鹿田西村前 111	21-0811	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
丹羽クリニック	鹿田花の木 140-1	25-6600	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
師勝産婦人科	熊之庄射矢重 10-1	22-4417	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○
師勝クリニック	熊之庄八幡 117-1	22-4565	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	※
いぶき野クリニック	熊之庄宮地 10	26-3600	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○
ようていファミリークリニック	熊之庄宮地 97	80-7124	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○
山田クリニック	熊之庄屋形 3377-2	23-0598				○		○	○	○	○					○	
田中クリニック	高田寺出口 25-1	25-7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	※
新居クリニック	井瀬木鴨 72	23-2200	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○
湯浅医院	九之坪北町 32	21-0113	○	○		○		○	○	○	○	○		○		○	○
安田クリニック	九之坪竹田 188	26-2020	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
末沢医院	沖村蔵前 3	23-6467				○		○	○	○	○					○	
さはし内科クリニック	法成寺西出 6-1	24-1384						○	○	○	○	○				○	
ハルクリニック	徳重米野 37-1	25-8001	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○
ようてい健康増進クリニック	西之保三町地 3-1	23-3355	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
にしのほう伊藤内科クリニック	西之保中社 21-2	23-1109	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安藤クリニック	西之保才戸 26	24-0001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
西春整形外科	西之保深坪 19	21-5521														○	
よしの耳鼻咽喉科	久地野北浦 100-1	23-1212														○	
もりメンタルクリニック	西春駅前1-1パティオ西春2F	21-5568														○	

清須市、豊山町の指定医療機関、名鉄病院、かしの木こどもクリニック、やまかわこどもクリニックでも接種が可能です。

※同時接種については各医療機関にお問い合わせください。

予防接種についての注意点

★市外に転出された時

北名古屋市外に転出された時は、すこやか手帳の予診票は使用できません。新しい住所地で交換してください。

★接種間隔を守って受けましょう

生ワクチン

MR(麻しん風しん)、麻しん、風しん、BCG、
ロタウイルス、おたふくかぜ、水痘(水ぼうそう)

27日(4週間)以上あける

不活化ワクチン

四種混合、二種混合、ポリオ、子宮頸がん予防、ヒブ、
小児用肺炎球菌、日本脳炎、インフルエンザ、B型肝炎

6日(1週間)以上あける

次の予防接種

生ワクチン

不活化ワクチン

※同じワクチンを続けて接種する場合は、そのワクチンの定められた間隔で接種します

★こんな時は、予防接種が受けられません

※37.5℃以上の発熱やせき、鼻水があったときは、症状がおさまってから2週間以上あけてください。

※はしか、風疹、水ぼうそう、おたふくかぜなどにかかった時は、病気がなおってから4週間以上あけてください。また、これらの病気にかかった子と接触したときは、3~4週間あけてください。

※熱性けいれん(ひきつけ)を起こした後は、3~6か月あけてください。(詳しくはかかりつけ医にご相談ください。)

★愛知県広域予防接種事業について

市外にかかりつけ医がいる、長期入院中、里帰りなどの諸事情により、指定医療機関以外での定期予防接種を希望する方は、保健センターへお問い合わせください。